

MORFOLOXÍA EXTERNA

A morfoloxía externa é unha das armas máis antigas dos gandeiros e veterinarios, tamén é unha das que máis ten evolucionado nos últimos tempos.

Serve de base para describir e diferenciar un individuo co que podemos observar del e para poder intuír en base a isto como van ser as súas características produtivas.

A morfoloxía permítenos describir un individuo ou un grupo de individuos de trazos semellantes (raza). Isto é moi importante na identificación individual e na creación dos estándares dunha raza, é dicir, das características morfolóxicas que debe ter unha raza.

Termos que usaremos para describir morfoloxicamente un animal:

PROPORCIÓN

- **Lonxilíneo (+)** (proporcións corporais longas, menos compacto)
- **Mesolíneo (0)** (proporcións corporais medias)
- **Brevilíneo (-)** (proporcións corporais curtas, máis compacto)



Longilíneo o dolicomorfo



Mediolíneo o mesomorfo



Brevilíneo o braquimorfo

PESO OU CORPULENCIA

- **Hipermétrico (+)** (peso superior á media da especie)
- **Eumétrico (0)** (peso medio)
- **Elipométrico (-)** (peso inferior á media)

	Elipométrico	Eumétrico	Hipermétrico
Équidos	100-150	350-450	750-1000
Bóvidos	300-400	500-800	900-1100
Ovinos	30-50	50-80	80-130
Porcinos	80-150	200-300	300-400

PERFIL OU SILUETA

- **Cóncavo (-)** (máis deprimido do centro, "retén a auga", val)
- **Recto ou Ortoide (0)**
- **Convexo (+)** (máis deprimido dos bordes, "expulsa a auga", montaña)



BIOTIPOS

Un biotipo é a forma típica que posúe un animal, e que é considerado o modelo da súa especie, raza ou variedade.


- **Exemplo 1 de biotipo:** Existen varios estudos nos que se sinalan distintos tipos de biotipos, entre eles o de Aparicio Sánchez, que sinala 3 biotipos:
 1. *Metabólico:* existe equilibrio entre os sistemas hormonal e nervioso, harmonía nas formas. Reacción temperamental xusta, gran capacidade de adaptación. Dimorfismo sexual marcado. Cerebral: gran capacidade de aprendizaxe.
 2. *Hipermetabólico:* Predominio da lonxitude (tronco e extremidades alongadas). Masas musculares xustas, fortes. Reaccións desproporcionadas ao estímulo. Animais nerviosos: desequilibrio hormonal e nervioso.

3. *Anabólico*: Reaccións lentas, temperamento tranquilo. Cabezas pequenas e troncos amplos. Muscular ou masivo: formas amplas.

- **Exemplo 2 de biotipo: BIOTIPO CEFÁLICO**

Lonxitude: tomada dende a crista da caluga ao extremo rostral da sutura interincisiva.

Anchura: tomada entre os bordes dos arcos cigomáticos.



Calcúlase o índice cefálico total utilizando a fórmula:

$$\text{Índice cefálico total} = \text{Anchura} * 100 / \text{Lonxitude}$$

A partir do resultado desta fórmula determínase:

- ***Dolicocéfalo***: Índice Cefálico inferior a 55 (Ex. pointer, pastor alemán)
- ***Mesocéfalo***: Índice Cefálico entre 55 y 80
- ***Braquicéfalo***: Índice Cefálico superior a 80 (Ex. bóxer, bulldog)

FANERÓPTICA

Este termo refírese ás particularidades da pel que se poden apreciar a simple vista, así como aos seus anexos (pezuños, cornos, crinas).

Capa ou pelo chámase ás distintas coloracións que poden ter os animais, en aves chámase pinta ou plumaxe.


Nas cornamentas apreciaremos implantación, lonxitude, forma, cor, diámetro, firmeza e capa superficial.

❖ VALORACIÓN EXTERIOR

Para facer unha valoración morfolóxica de calquera animal primeiro debemos coñecer certos termos técnicos e a denominación correcta das súas rexións corporais.


Video: Calcular a idade dunha vaca: <https://www.youtube.com/watch?v=N8ur5WSI8DM&t=184s>

- **Eixos direccionais nun cuadrúpede:**




○ **NOMENCLATURA DA MORFOLOGIA DOS PRINCIPAIS ESPECIES ZOOTÉCNICAS:**


Especie bovina (Vaca):




Especie equina (cabalo):



Especie aviar (galos e galiñas):



Especie suína (porco):



- 1. Cabeza
- 2. Cruz
- 3. Dorso
- 4. Plano dorsal
- 5. Lombo
- 6. *Grupa* ou cruz dos cadrís
- 7. *Corvejón* ou xarrete
- 8. Canas
- 9. Pezuños
- 10. Extremidades posteriores
- 11. Ventre
- 12. Plano ventral
- 13. Base do tórax
- 14. Extremidades anteriores
- 15. *Rodillas*
- 16. *Espaldas*

❖ ZOOMETRÍA

Coa zoometría estudamos as formas dos animais, para isto, tomamos medidas corporais concretas, o que nos permite cuantificar a conformación corporal.

Instrumentos cos que tomaremos as medidas:



Cinta métrica (por exemplo, para medir perímetro torácico):



Bastón zoométrico (tamén chamado hipométrico) (por exemplo para medir alzada á cruz):



Compás de brocas (para distancias pequenas):




Calibre (para anchos e diámetros pequeños):



Pelvímetro:



Goniómetro (para medir ángulos):



A zoometria é outra ferramenta para poder diferenciar razas.


As principais medidas son:

- a) Lineais (alzadas, lonxitudes, anchuras e profundidades). Deben tomarse sobre planos horizontais.
- b) Anchuras (diámetros transversais).
- c) Perímetros.

Medidas lineais:



Perímetros e anchuras:



Existen tres sistemas de valoración do exterior dos animais:

1. Estándar racial

Consiste nunha descrición moi detallada dunha serie de parámetros xerais e particulares:

- Morfoloxía xeral: peso, perfil, proporcións.
- Morfoloxía rexional: cabeza, pescozo, tronco, *grupa* (=cruz dos cadrís) e extremidades.
- Particularidades: orellas, ollos, boca, papada, cola, ubre, órganos sexuais externos, etc.
- Faneros: cornos, pezuños, pelo, lá, plumaxe, peteiro, etc.
- Coloración: en faneros, pel, mucosas, ollos, etc.
- Fotografía e vídeo: recolle de forma gráfica as características da raza ou dun animal en concreto, incluso en movemento.

Exemplo, estándar racial da RAZA RUBIA GALEGA (vacún de aptitude cárnica):

Características xerais

A raza caracterízase por ter gran rusticidade e capacidade de adaptación a medios adversos. É unha raza dócil, de fácil manexo que se caracteriza pola súa mansedume. Excelentes calidades maternais.

Morfoloxía

Formato de tipo medio e proporcionado, tórax profundo, longo e arqueado; dorso e lombos anchos, planos e musculados; e coxas, nádegas e pernas convexos, longos e descendidos. O esqueleto é robusto, forte e ben desenvolvido. E todas estas condicións coinciden perfectamente coa conformación xeral, longa, profunda e con ampulosidade e anchura, dos animais especializados na produción cárnica.

A cor fundamentalmente é o louro, trigueño ou canela (capa teixa), admitíndose oscilacións que van desde o claro ou marelo ao escuro ou vermello. As mucosas sonrosadas e as pezuños e cornos de cor clara, desde o branco rosáceo ao castiñeiro, con algún escurecemento nas puntas.



2. Carta de puntuación


Obtense a partir da suma dunha serie de valoracións parciais e subxectivas de cada rexión. Varía segundo a raza e en función da súa orientación produtiva. Úsase en concursos de gando.

Exemplo: Ficha para concurso morfolóxico-funcional do cabalo de pura raza español:

ANEXO III	
FICHA DE CALIFICACIÓN - Morfología - Secc. 14ª	
DORSAL	NOMBRE
	SECCIÓN
	CONCURSO

REGIONES		PUNTUACIONES																				coeficiente	TOTAL	
		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5			10
1	MOVIMIENTOS	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	1,400	
2	MANEJABILIDAD	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	1,400	
3	PRESENTACIÓN	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	0,900	
4	UNIFORMIDAD DE CAPA	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	1,400	
5	CALIDAD Y UNIFORMIDAD ALZADA	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	1,400	
6	CALIDAD Y UNIFORMIDAD CONFORMACIÓN	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	1,700	
7	CALIDAD Y UNIFORMIDAD CARACTERES RACIALES	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	1,800	


TOTAL FINAL



3. Valoración obxectiva:

- **Medidas e índices zoométricos:** Tomados sempre co mesmo instrumentas, metodoloxía e persoa para minimizar erros. Segundo a especie e aptitude terán máis ou menos interese.
- **Codificar os caracteres morfolóxicos:** Poñer números para valoralos, sen usar o cero. Algúns poden ser medidas. En cada especie poden variar.
- **Codificación de caracteres fanerópticos.**

Exemplo 1: Método de cualificación morfolóxica da Confederación de Asociacións de Frisona Española (CONAFE):



Estatura

Es la medida de la vaca desde el suelo hasta la grupa y entre los iliones. El tercio anterior es la medida de la vaca desde el suelo a la cruz y en referencia con la estatura.



Anchura de pecho

Es la medida entre las dos patas delanteras, en el punto más alto.




Profundidad corporal

Mide la profundidad de la parte central del cuerpo del animal. Es la distancia entre la línea dorso-lumbar y la parte más baja del barril.




Anchura de isquiones

Mide la distancia entre la punta de los isquiones.



9-8-7 Isquiones demasiado bajos



6-5-4 Pequeña inclinación entre ilión e isquión



3-2-1 isquiones demasiado altos

Ángulo de la grupa

Mide el ángulo de la estructura de la grupa, desde los iliones hasta los isquiones.



9-8-7 Muy fina y angulosa



6-5-4 Angulosa



3-2-1 No deseable, gruesa y tosca

Angulosidad


El arqueamiento y ángulo de las costillas.



1-2-3 Muy descarnada



4-5-6 Intermedia



7-8-9 Acumulación de tejido graso

Condición corporal

Es la acumulación de grasa que se ve al observar al animal.



9-8-7 Fuerte y deseable



6-5-4 Intermedia




3-2-1 Débil

Inserción anterior

Mide el grado de adherencia de la ubre con la pared abdominal mediante ligamentos laterales.



9-8-7 Alta y deseable




6-5-4 Intermedia




3-2-1 Baja

Altura inserción posterior


Es la distancia entre la vulva y el tejido secretor noble.



9-8-7 Fuerte, cuartos bien definidos




6-5-4 Intermedio




3-2-1 Débil, sin divisiones definidas

Ligamento suspensor


Se mide como la profundidad del surco en la base de la ubre posterior.



9-8-7 Poco profunda




6-5-4 Deseable




3-2-1 Demasiado profunda

Profundidad de ubre


Se mide como la distancia desde la parte más baja del piso de la ubre al corvejón.



9-8-7 Muy juntos



6-5-4 Deseable, bien centrados



3-2-1 Fuera de los cuartos

Colocación de pezones anteriores y posteriores

Es la posición que ocupa la base del pezón respecto al centro del cuarterón.



9-8-7 Alta y deseable




6-5-4 Intermedia




3-2-1 Baja

Altura inserción posterior


Es la distancia entre la vulva y el tejido secretor noble.



9-8-7 Fuerte,
cuartos bien definidos




6-5-4 Intermedio




3-2-1 Débil,
sin divisiones definidas

Ligamento suspensor


Se mide como la profundidad del surco en la base de la ubre posterior.



9-8-7 Poco profunda




6-5-4 Deseable




3-2-1 Demasiado profunda

Profundidad de ubre


Se mide como la distancia desde la parte más baja del piso de la ubre al corvejón.



9-8-7
Muy juntos



6-5-4
Deseable, bien centrados



3-2-1
Fuera de los cuartos

Colocación de pezones anteriores y posteriores

Es la posición que ocupa la base del pezón respecto al centro del cuarterón.



9-8-7 Muy largos



6-5-4 Deseables



3-2-1 Muy cortos

Longitud de pezones anteriores

Es la medida de los pezones valorada en centímetros.



9-8-7 Deseable



6-5-4 Intermedio



3-2-1 No deseable

Ángulo podal

Es el ángulo que forma el pie trasero con la horizontal del suelo. Se mide en la parte anterior de la pezuña.



9-8-7 Curvadas



6-5-4 Deseables



3-2-1 Rectas

Vista lateral de las patas

Medida del ángulo en la parte anterior del corvejón.




9-8-7 Paralelas



3-2-1 Muy juntas

Vista posterior de las patas

Es el grado de paralelismo entre los planos de las patas, desde el corvejón a la pezuña.



9 No aducción
Paso largo y firme

5 Movilidad
media

1 Movilidad
mala

Movilidad

Es el uso de las patas y pies al caminar, longitud y dirección del paso.

Exemplo 2: Método de cualificación morfolóxica de ASOPORCEL:

Os veterinarios de ASOPORCEL son técnicos validados para tal fin pola Comisión Reitora do Libro Xenealóxico. Esta cualificación realízase mediante apreciación visual e polo método dos puntos, no que o detalle servirá para xulgar comparativamente o valor dun exemplar determinado.

Cada rexión corporal cualifícase asignándolle de 1 a 10 puntos. A adxudicación de menos de 4 puntos a calquera das rexións que se valoren será causa para descualificar o animal. Os caracteres que hai que considerar son os que a continuación se relacionan, con expresión para cada un deles do coeficiente de ponderación. Os puntos que se asignen a cada un dos ditos aspectos multiplicaranse polo coeficiente correspondente, resultando así a puntuación definitiva.

A modo de exemplo do feito, darei unha cualificación para cada característica morfolóxica:

– **Aspecto xeral (desenvolvemento, proporcións e peso):** A raza Celta está formada por animais dolicocefalos e mesencefalos, de tipo lonxilíneo, de sistema óseo e muscular moi desenvolvido, sobre todo o terzo anterior. Son animais rústicos, áxiles, con boa aptitude para a marcha polo seu forte aparato locomotor que lles permite percorrer grandes distancias no pastoreo, como se facía antigamente con esta raza en Galicia.

Ex. Puntuación = 8. Factor: 1,9.

– **Pel, pelo, pigmentación:** Nas tres variedades de Porco Celta (Santiaguesa, Carballina e Barcina) a pel está cuberta de abundantes serdas, longas e fortes, que son máis abundantes na variedade Carballina.

Ex. Puntuación = 9. Factor: 0,3.

– **Testa:** De tamaño grande, ancha e alongada; frontais anchos e planos, formando unha aresta aguda na liña da caluga. Os ósos nasais son longos e forman un ángulo obtuso coa fronte. O cranio forma unha testa moi voluminosa terminada cunha face ancha e grosa. Orelas grandes e caídas que cobren os pequenos ollos.

Ex. Puntuación = 8. Factor: 1,7.

– **Pescozo e tórax:** O pescozo debe ser longo e estreito, pero forte. Tórax forte e profundo, con costelares pouco arqueados.

Ex. Puntuación = 8. Factor: 0,4.

– **Costas:** Longas, lixeiramente inclinadas e de manifesta musculatura, facendo máis robusto o terzo anterior.

Ex. Puntuación = 7. Factor: 0,5.

– **Dorso e lombo:** Estreitos e arqueados. É longo pero aplanado, co dorso encarpa.

Ex. Puntuación = 8. Factor: 1,3

– **Cruz dos cadrís e xamóns:** Cruz dos cadrís caída e estreita. Rabo groso e longo, provisto na súa extremidade dunha borla de serdas, retórcese de xeito típico. Xamóns escasos en forma de violín.

Ex. Puntuación = 8. Factor: 1,5.

– **Ventre e xenitais:** Ventre recollido, tronco prolongado (porque conta con seis vértebras lumbares). As femias posúen de doce a dezoito mamas, son moi prolíficas, parindo xeralmente de dez a catorce leitóns. Vulva ben formada. Nos machos testículos ben formados, simétricos en lonxitude e tamaño.

Ex. Puntuación = 6. Factor: 0,6.

– **Asentamento das extremidades e marcha:** Patas longas, con masas musculares desenvolvidas. Caracterízase por ter un terzo anterior máis forte que o posterior. Marcha viva, grácil e de acaneo característico da raza.

Ex. Puntuación = 8. Factor: 1,8.

Ex. Resultado: $(8 \times 1,9) + (9 \times 0,3) + (8 \times 1,7) + (8 \times 0,4) + (7 \times 0,5) + (8 \times 1,3) + (8 \times 1,5) + (6 \times 0,6) + (8 \times 1,8) = 78.6$

Machos: Teñen que obter unha puntuación total superior a 60 puntos.

Femias: Puntuación superior a 50 puntos.

Na raza Porco Celta considéranse defectos obxectables (restan puntos ao momento da valoración morfolóxica):

- Defectos no asentamento das extremidades non moi destacables.
- Extremidades curtas que fan baixo ao animal.
- Fociño pouco formado.

E considéranse defectos descualificables (a súa presenza elimina directamente ao animal):

- Conformación xeral ou rexional defectuosa en grao acusado (cabeza moi pequena e pouco voluminosa, perfil convexo, orellas curtas, estreitas ou levantadas, liña dorsolumbar recta, grupa horizontal e moi musculada).
- Hernias.
- Anomalías nos xenitais: monórquido, criptórquido e infantilismo xenital.
- Formación corporal non acorde coa idade.
- Pigmentación total ou parcial dos pezuños.

Dentro da raza Porco Celta existen tres ecotipos ou variedades segundo a tonalidade da capa:

- A variedade **santiaguesa** caracterízase por posuír unha pel rosada con ausencia total de pigmentacións.
- A variedade **barcina** posúe pequenas pigmentacións, como lunares circulares de cor de lousa.
- A variedade **carballina** caracterízase polas súas extensas pigmentacións negras brillantes que en ocasións poden chegar a cubrir todo o seu corpo.

