



**XUNTA DE GALICIA**  
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN  
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA



**CFR**  
**FERROL** centro de  
formación e recursos

# **Primeiros auxilios, situacións de urxencia e continxencias que poden ter lugar nun centro escolar**

**Relator: Carlos M<sup>a</sup> Agrasar Cruz**  
**Departamento de Medicina**  
**Universidade da Coruña**

**Outubro-novembro de 2013**

# Obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño



Lunes 17 de septiembre de 2007 [Contacte con laopinioncoruña.es](#) | [RSS](#)

<b>laopinioncoruña.es</b>		NOTICIAS <b>Sucesos</b>		HEMEROTECA »	● EN ESTA WEB ●	Google™	<input type="text"/>	<input type="button" value="▶"/>				
INICIO	NOTICIAS	DEPORTES	ECONOMÍA	OPINIONES	GENTE Y OCIO	SERVICIOS						
<a href="#">A Coruña/Metro</a>	<a href="#">Galicia</a>	<a href="#">España</a>	<a href="#">Mundo</a>	<b>Sucesos</b>	<a href="#">Economía</a>	<a href="#">Mar</a>	<a href="#">Deportes</a>	<a href="#">Cultura</a>	<a href="#">Ciencia</a>	<a href="#">Tecnología</a>	<a href="#">Fotos de actualidad</a>	<a href="#">Contraportada</a>

[laopinioncoruña.es](#) » **Sucesos**



TENÍA 78 AÑOS

## Fallece un hombre al ahogarse con un trozo de carne en un restaurante de A Coruña

🕒 18:22 **VOTE ESTA NOTICIA** ☆☆☆☆☆



Un hombre de 78 años de edad falleció hoy al ahogarse con un trozo de carne en un restaurante situado en la Rúa Martinete en la ciudad de A Coruña.

**EUROPA PRESS** Los hechos sucedieron sobre las 12.19 horas y hasta el lugar Urgencias Sanitarias 061 trasladó a una ambulancia medicalizada para atender a la víctima, F.M.D., pero, a pesar de los esfuerzos del personal sanitario, el hombre falleció en el lugar.

Asimismo, el 061 evacuó al Complejo Hospitalario de Ourense (CHOU) a un hombre de 49 años, identificado como P.O.D., que se cayó de una escalera de mano y sufrió politraumatismos en el municipio de Taboadela (Ourense).

El suceso tuvo lugar sobre las 13.33 horas en el lugar de O Amendo, en la parroquia de Touza. Hasta el lugar acudió una ambulancia asistencial del 061, el médico del centro de salud de Taboadela y el helicóptero medicalizado con base en Ourense.

### HEMEROTECA

**Volver a la Edición Actual**



Blog

**La ciudad que viví**

La ciudad de ayer contada por gente de hoy


<b>GRANDES ! IDEAS</b>			
<b>TODOS LOS DOMINGOS CON La Opinión</b>			
De la experiencia y otros ensayos <b>Montaigne</b>	El existencialismo es un humanismo <b>Sartre</b>	Sobre la amistad clásica y humanista <b>Aristóteles</b>	El banquete <b>Platón</b>

### CONCURSO

**Envíanos tu foto**  
y participa en un gran concurso




## Tratamiento de la OVACE del adulto



## Revisión de la boca

**Evitar el barrido digital a ciegas.  
Retirar el material solo si puede verse.**

**Pueden causarse daños a la víctima.**




Retirar el objeto con el dedo  
ÚNICAMENTE si la persona lo puede ver





# **Palmadas en la espalda**

## **Se dan cinco golpes interescapulares**



# Las palmadas interescapulares se continúan con compresiones abdominales (maniobra de Heimlich)

Cubrir el puño con la otra mano y presionar hacia arriba y hacia adentro con la fuerza suficiente para levantar la víctima del suelo




## Maniobra de Heimlich en niños

Colocar un puño justo por encima del ombligo del niño con el lado del pugar dando hacia el abdomen





- Las compresiones torácicas se han mostrado más efectivas que las abdominales.
- En **embarazadas**, realizar compresiones torácicas en el mismo lugar que la RCP.



# Automaniobra de Heimlich



Colocar el puño sobre el ombligo mientras se sostiene el puño con la otra mano. Inclinar sobre una silla o encimera y llevar el puño hacia sí con fuerza y presionando hacia arriba

# Desobstrucción en lactantes



Colocar al lactante boca abajo sobre el antebrazo y dar cinco golpecitos en la espalda de éste con la parte carnosa de la mano



# Desobstrucción en lactantes

Colocar dos dedos en la mitad del esternón del bebé y dar 5 compresiones rápidas hacia abajo



ADAM.



Si los golpes en la espalda no pueden expulsar el objeto y el niño aún está consciente, usa las compresiones torácicas en lactantes o las compresiones abdominales en los niños.

**¡No usar las compresiones abdominales (maniobra de Heimlich) en lactantes!**