

DESOBSTRUCCIÓN VÍA AÉREA

- ⦿ Obstrucción leve: puede hablar, toser y respirar -> ANIMAR A TOSER.

- ⦿ Obstrucción severa:
 - ✓ No puede hablar
 - ✓ No puede toser
 - ✓ No puede respirar o respiración muy ruidosa
 - ✓ Inconsciencia

Obstrucción severa

- PACIENTE CONSCIENTE:

- × 5 golpes en la espalda

- × 5 compresiones abdominales



Menores de 1 año (lactantes)

Retirar el objeto con el dedo
ÚNICAMENTE si la persona lo puede ver



Colocar al bebé boca abajo a lo largo del antebrazo y darle 5 golpes fuertes y rápidos en la espalda con el talón de la mano



Colocar dos dedos en la mitad del esternón del bebé y dar 5 compresiones rápidas hacia abajo



Obstrucción severa

⦿ PACIENTE INCONSCIENTE:

- ✗ Iniciar RCP
- ✗ Revisar boca en busca de cuerpo extraño



Extracción de cuerpo extraño en cavidad bucal

- ⦿ Retirar manualmente SÓLO si puede verse
- ⦿ Evitar barrido digital a ciegas




Fig. 5.6. Maniobra de barrido.

GRACIAS