

## FICHA 8 ESTADÍSTICA

### PROBLEMAS DE DISTIBUCIÓN NORMAL CON TABLA INVERSA O INTERESANTES

1. (Aragón 2021, Ordinaria) La cantidad de hierro en suero de una mujer adulta sigue una distribución normal de media  $120 \mu\text{g/dl}$  y una desviación típica de  $30 \mu\text{g/dl}$ . Se considera que una mujer tiene anemia ferropénica si la cantidad de hierro no llega a  $75 \mu\text{g/dl}$ .
  - a. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer tenga este tipo de anemia?
  - b. El 45% de las mujeres adultas tienen una cantidad superior a un valor  $k$ . Averigüe dicho valor.
2. (Asturias 2021, Ordinaria) Se tiene un suceso con variable aleatoria  $X$  que sigue una distribución normal de media  $\mu = 10$  y desviación típica  $\sigma = 2$ . Calcula:
  - a. La probabilidad de que  $X \in [6, 10]$ .
  - b. Se hace una revisión de los datos y se observa que la media coincide pero la probabilidad del 80 % se alcanza en el valor  $X \leq 12$ . ¿Cuál es la nueva desviación típica?
3. (Murcia 2021, Ordinaria) La velocidad de los vehículos en una autopista con límite de velocidad de  $120 \text{ km/h}$  sigue una distribución normal de media  $\mu \text{ km/h}$  y desviación típica  $\sigma = 10 \text{ km/h}$ . Se sabe que el 69,15% de los vehículos no sobrepasan la velocidad de  $130 \text{ km/h}$ .
  - a. Calcule la media de esta distribución.
  - b. ¿Cuál es el porcentaje de vehículos que no sobrepasan la velocidad máxima permitida?
  - c. La DGT establece una multa de 100 euros a los vehículos que viajan entre  $120$  y  $150 \text{ km/h}$ . ¿Cuál es la probabilidad de ser sancionado con dicha multa?
4. (Asturias 2021, Extraordinaria) Se tiene un suceso con variable aleatoria  $X$  que sigue una distribución normal de media  $\mu = 30$  y desviación típica  $\sigma = 10$ . Calcula:
  - a. La probabilidad de que  $X \leq 20$ .
  - b. Se hace una revisión de los datos y se observa que la probabilidad del 50 % se alcanza en el valor  $X \leq 35$ . y la probabilidad del 75 % se alcanza en el valor  $X \leq 40$ . ¿Cuáles son las nuevas media y desviación típica?

NOTA: Algunos valores de la función de distribución de la distribución normal de media 0 y desviación típica 1:  $F(x) = P(Z \leq x)$ ,  $F(0) = 0.5$ ,  $F(0.6745) = 0.75$ ,  $F(0.8416) = 0.8$ ,  $F(1) = 0.8413$ ,  $F(1.375) = 0.9154$ ,  $F(1.5) = 0.9332$ ,  $F(2) = 0.9772$
5. (Cantabria 2021, Ordinaria) La testosterona es una hormona que se produce en el cuerpo de los hombres. En ciclismo la testosterona puede utilizarse como sustancia dopante, de forma que niveles elevados se consideran ilegales. En una población dada, la concentración de testosterona en sangre para un hombre adulto que no se haya dopado, sigue una distribución normal con media  $600 \mu\text{g/dl}$ , y desviación típica  $200 \mu\text{g/dl}$ .
  - a. Calcula la probabilidad de que un ciclista presente más de  $1000 \mu\text{g/dl}$  de testosterona en sangre sin haberse dopado.
  - b. ¿Qué nivel de testosterona elegirías como límite en un control antidopaje, para que la probabilidad de acusar a un inocente sea de 1 entre 1000?
6. (Cantabria 2021, Extraordinaria) En una determinada población de adultos sanos, la concentración media de colesterol en sangre sigue una distribución normal con media  $190 \text{ mg/dl}$  y desviación típica  $30 \text{ mg/dl}$ . Un nivel elevado de colesterol puede indicar posibles problemas de salud.
  - a. Calcula la probabilidad de que un adulto sano de la población tenga un nivel de colesterol superior a  $250 \text{ mg/dl}$ .
  - b. Calcula qué nivel de colesterol solo superan el 1% de adultos sanos de dicha población.

7. (Castilla-León 2021, Ordinaria) El tiempo empleado, en minutos, para obtener la respuesta de un test para detectar cierta enfermedad sigue una distribución normal de media 20 y de desviación típica 4.
- ¿En qué porcentaje de test se obtiene el resultado entre 16 y 26 minutos?
  - ¿Cuántos minutos son necesarios para garantizar que se ha obtenido la respuesta del 96,41% de los test?
8. (Extremadura 2021, Modelo) Una empresa cárnica produce cerdos y ha comprobado que el peso de los animales recién nacidos sigue una distribución normal de media 4,2 kg y desviación típica 0,5 kg. Calcular:
- La probabilidad de que un animal elegido al azar pese entre 3,7 y 4,7 kg.
  - ¿Qué peso debería tener un animal recién nacido para que esté por encima del 30%?
9. (Extremadura 2021, Ordinaria) Las notas del examen de Matemáticas II de la EBAU siguen una distribución normal de media 6,5 y desviación típica de 1,5. Se elige al azar un alumno de Matemáticas II de la EBAU:
- Calcular la probabilidad de que un alumno haya aprobado ( $\geq 5$ ).
  - Calcular la nota que tiene que sacar un alumno para que su nota sea superior al 97,50% de las notas.
10. (La Rioja 2021, Extraordinaria) El tiempo que una persona tarda en llegar a su lugar de trabajo sigue una distribución normal de media 20 minutos. Se ha comprobado que el 84,1 % de los días llega antes de 22 minutos. Si durante el año acude a su lugar de trabajo 290 días, ¿cuántos días puede estimar que tardará menos de 18 minutos en llegar?
11. (Madrid 2021, Ordinaria) El tiempo de vida de los individuos de cierta especie animal tiene una distribución normal con una media de 8,8 meses y una desviación típica de 3 meses.
- ¿Qué porcentaje de individuos de esta especie supera los 10 meses? ¿Qué porcentaje de individuos ha vivido entre 7 y 10 meses?
  - Si se toman al azar 4 especímenes, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno no supere los 10 meses de vida?
  - ¿Qué valor de  $c$  es tal que el intervalo  $(8,8 - c, 8,8 + c)$  incluye el tiempo de vida (medido en meses) del 98 % de los individuos de esta especie?
12. (Murcia 2021, Modelo) El tiempo de duración de las bombillas de una cierta marca, medido en horas, sigue una distribución normal de media  $\mu$  y desviación típica  $\sigma$ . Se sabe que el 69,50% de las bombillas duran menos de 5061,2 horas, y que el 16,60% de las bombillas duran más de 5116,4 horas.
- ¿Cuál es la probabilidad de que una bombilla de esta marca dure entre 5061,2 y 5116,4 horas?
  - Calcule la media y la desviación típica de esta distribución normal.