



Nome: _____

1 1,5 ptos	2 1 ptos	3 1 ptos	Nota

(Se non hai indicacións, todos os apartados valen o mesmo)

1. Dada a función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + a}{2x - 4} & \text{se } x \leq 0 \\ 10x^2 + x + b & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

a) Atopa a condición que teñen que cumprir os parámetros a e b para que a función $y = f(x)$ sexa continua.

b) Calcule $f'(x)$.

c) Atopa a condición que teñen que cumprir os parámetros a e b para que a función $y = f(x)$ sexa derivable.

(Balears Ordinaria 2022)

2. Calcula os seguintes límites (non se pode usar L'Hôpital nos dous apartados):

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + (1 - x)^2 - 1}{\ln(\cos x)}$ (Extremadura Xuño 2017)

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 - x + 1} - \sqrt{2x - 1}}{1 - x}$ (Castilla y León Extraordinaria 2020)

3. a) Considera as funcións f e $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por $f(x) = 3 - x^2$ e $g(x) = -\frac{x^2}{4}$. Calcula a ecuación da recta tanxente á gráfica de f no punto de abscisa $x = 1$ e comproba que tamén é tanxente á gráfica de g . Determina o punto de tanxencia coa gráfica de g . (Andalucía Xuño 2018)

b) Enuncia o teorema de Bolzano. (Múltiples exames Galicia)

1. Dada a función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + a}{2x - 4} & \text{se } x \leq 0 \\ 10x^2 + x + b & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

a) Atopa a condición que teñen que cumprir os parámetros a e b para que a función $y = f(x)$ sexa continua.

b) Calcule $f'(x)$.

c) Atopa a condición que teñen que cumprir os parámetros a e b para que a función $y = f(x)$ sexa derivable.

(Balears Ordinaria 2022)

a) A función é continua en $(-\infty, 0)$ porque é un cociente de polinomios e o denominador non se anula nese intervalo.

A función é continua en $(0, +\infty)$ porque é unha función polinómica.

Imos analizar que ocorre en $x=0$. Para que sexa continua en $x=0$ teu que cumprir que $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 + a}{2x - 4} = -\frac{a}{4} = f(0) \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} 10x^2 + x + b = b \end{aligned} \right\} \text{ logo para que sexa continua: } -\frac{a}{4} = b \Rightarrow a = -4b$$

$$b) f'(x) = \begin{cases} \frac{2x(2x-4) - (x^2+a) \cdot 2}{(2x-4)^2} & x < 0 \\ 20x + 1 & x > 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{2x^2 - 8x - 2a}{(2x-4)^2} & x < 0 \\ 20x + 1 & x > 0 \end{cases}$$

c) A función é derivable en $(-\infty, 0)$ e $(0, +\infty)$ por razóns análogas ás do apartado a).

Analizamos que pasa en $x=0$. Para que a función sexa derivable teu que verificar $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x^2 - 8x - 2a}{(2x-4)^2} = \frac{-2a}{(-4)^2} = \frac{-2a}{16} = -\frac{a}{8} \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} 20x + 1 = 1 \end{aligned} \right\} \text{ Para que sexa derivable } -\frac{a}{8} = 1 \Rightarrow a = -8$$

Para que a función sexa derivable teu que ser continua, logo $a = -4b \Rightarrow$

$$\Rightarrow -8 = -4b \Rightarrow b = 2$$

Para que a función sexa derivable $a = -8$, $b = 2$.

2. Calcula os seguintes límites (non se pode usar L'Hôpital nos dous apartados):

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + (1-x)^2 - 1}{\ln(\cos x)}$ (Extremadura Xuño 2017)

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 - x + 1} - \sqrt{2x - 1}}{1 - x}$ (Castilla y León Extraordinaria 2020)

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + (1-x)^2 - 1}{\ln(\cos x)} = \frac{0}{0}$ indeterminación
 $\parallel \leftarrow$ L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos 2x) \cdot 2 + 2(1-x) \cdot (-1)}{\frac{1}{\cos x} \cdot (-\sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\cos 2x - 2(1-x)}{-\tan x} = \frac{0}{0} \text{ indeterminar.}$$

$\parallel \leftarrow$ L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(-\sin 2x) \cdot 2 - 2 \cdot (-1)}{1 + \tan^2 x} = \frac{2}{1} = 2$$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 - x + 1} - \sqrt{2x - 1}}{1 - x} = \frac{0}{0}$ indeterminación

$\parallel$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x^2 - x + 1} - \sqrt{2x - 1})(\sqrt{x^2 - x + 1} + \sqrt{2x - 1})}{(1 - x)(\sqrt{x^2 - x + 1} + \sqrt{2x - 1})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x + 1 - (2x - 1)}{(1 - x)(\sqrt{x^2 - x + 1} + \sqrt{2x - 1})} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{(1 - x)(\sqrt{x^2 - x + 1} + \sqrt{2x - 1})} = \frac{0}{0} \text{ indeterminación}$$

$\parallel$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-2)}{-(x-1)(\sqrt{x^2 - x + 1} + \sqrt{2x - 1})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-2}{-(\sqrt{x^2 - x + 1} + \sqrt{2x - 1})} = \frac{1-2}{-(\sqrt{1+1} + \sqrt{1})} = \frac{1}{2}$$

3. a) Considera as funcións f e $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por $f(x) = 3 - x^2$ e $g(x) = -\frac{x^2}{4}$.
Calcula a ecuación da recta tanxente á gráfica de f no punto de abscisa $x = 1$ e
comproba que tamén é tanxente á gráfica de g . Determina o punto de tanxencia
coa gráfica de g . (Andalucía Xuño 2018)

b) Enuncia o teorema de Bolzano. (Múltiples exames Galicia)

a) A ecuación da recta tanxente en $x=1$ é: $y - f(1) = f'(1)(x-1)$

Como $f'(x) = -2x$, temos que a recta é: $y - 2 = (-2)(x-1)$

$$y = -2x + 2 + 2 = -2x + 4$$

Temos a recta que é tanxente a $f(x)$ en $x=1$. Esa mesma recta é
tanxente a g , é queremos saber en que punto. Consideramos que ese
punto é " a ", logo a recta tanxente vai ser: $y - g(a) = g'(a)(x-a)$

$$g'(x) = -\frac{2x}{4} = -\frac{x}{2}$$

$$\text{Recta tanxente: } y - \frac{a^2}{4} = -\frac{a}{2}(x-a) \Rightarrow y = -\frac{ax}{2} + \frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{4} = -\frac{a}{2}x + \frac{a^2}{4}$$

Ten que coincidir coa recta que temos; logo:

$$-\frac{a}{2} = -2 \Rightarrow a = 4$$

$$\frac{a^2}{4} = 4 \longrightarrow \text{Se } a=4 \text{ efectivamente se cumpre}$$

Logo o punto buscado é $a=4$.

b) TEOREMA DE BOLZANO: Sexa $f(x)$ unha función continua no intervalo $[a, b]$ que cum-
pre que $f(a) \cdot f(b) < 0$ (é dicir, o signo de $f(a)$ é diferente do signo de $f(b)$).
Entón existe $c \in (a, b)$ que verifica que $f(c) = 0$.



Nome: _____

1 1 ptos	2 1 ptos (0,75 + 0,25)	3 1,5 ptos (0,5 + 0,25 + 0,25 + 0,5)	Nota

(Se non hai indicacións, todos os apartados valen o mesmo)

1. Sexa $g(x) = x - \sin x$ con $x \in \mathbb{R}$

- Estudia os intervalos de crecemento e decrecemento de $g(x)$
- Obtén os máximos e mínimos absolutos de $g(x)$ no intervalo $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$

(Aragón 2025)

2. Na empresa "MARKOAK" fabrican marcos para cadros. Nesta ocasión lles solicitaron marcos para 274 cadros rectangulares. Todos os cadros teñen as mesmas dimensións e unha superficie de $0,3 \text{ m}^2$. Para cada marco van emplear dous tipos de material: as partes horizontais serán dun material cuio coste é de 12 €/m y para as verticais utilizarán un material cuio coste é de 10 €/m . A empresa que realiza o pedido quere pagar o mínimo posible. Calcula:

- Cales deben ser as medidas dos cadros para pagar o mínimo posible?
- A canto ascenderá a factura?

(País Vasco Ordinaria 2025)

3. a) Enuncia o teorema de Rolle. (Galicia múltiples anos)

b) Considera a función $f(x) = \frac{1}{x^4}$.

- Comproba que $f(2) = f(-2)$.
- Comproba que non existe $c \in [-2, 2]$ tal que $f'(c) = 0$.
- Hai unha contradición coa conclusión do teorema de Rolle?

(Balears Ordinaria 2021)

1. Sexa $g(x) = x - \sin x$ con $x \in \mathbb{R}$

a) Estudia os intervalos de crecemento e decrecemento de $g(x)$

b) Obtén os máximos e mínimos absolutos de $g(x)$ no intervalo $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$

(Aragón 2025)

a) Para estudar a monotonía da función, calculamos a súa derivada.

$$g'(x) = 1 - \cos x$$

Vemos que puntos poden ser extremos resolvendo $g'(x) = 0$.

$$g'(x) = 0 \Rightarrow 1 - \cos x = 0 \Rightarrow 1 = \cos x \Rightarrow x = 0, x = 2\pi, x = 4\pi, \dots$$

$$\{x / x = 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}\}$$

Os posibles extremos son as solucións da ecuación, analizamos o signo da función derivada a cada lado dos extremos:

$$\begin{array}{c} f'(x) > 0 \quad | \quad f'(x) > 0 \\ \hline 2k\pi \end{array}$$

A función é crecente en todo o seu dominio.

OUTRA POSIBLE SOLUCIÓN:

Para analizar o crecemento da función, analizaremos o signo da función derivada.

$$g'(x) = 1 - \cos x$$

O $\cos x < 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$, logo $1 - \cos x > 0$ para todo x .

A función derivada vai ser sempre positiva, logo $f'(x)$ vai ser sempre crecente.

b) A función é sempre crecente, o intervalo é pechado, logo o mínimo será o extremo inferior do intervalo e o máximo o superior.

(NOTA: Observa que se o intervalo fose aberto non poderíamos dicir cal é o extremo porque non sabemos cal é o número máis pequeno que podemos tomar, ou o máis grande)


$$\text{Punto mínimo: } x = \frac{\pi}{2}, f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} - 1 = 0,57$$

$$\text{Punto máximo: } x = \pi, f(\pi) = \pi - \sin \pi = \pi - 0 = \pi$$

2. Na empresa "MARKOAK" fabrican marcos para cadros. Nesta ocasión lles solicitaron marcos para 274 cadros rectangulares. Todos os cadros teñen as mesmas dimensións e unha superficie de $0,3 \text{ m}^2$. Para cada marco van emplear dous tipos de material: as partes horizontais serán dun material cuio coste é de 12 €/m y para as verticais utilizarán un material cuio coste é de 10 €/m . A empresa que realiza o pedido quere pagar o mínimo posible. Calcula:

1. Cales deben ser as medidas dos cadros para pagar o mínimo posible?
2. A canto ascenderá a factura?

(País Vasco Ordinaria 2025)



$$y \implies xy = 0,3 \implies y = \frac{0,3}{x}$$

Compra 274, quero saber o gasto mínimo, con que calcular o valor mínimo para un só cadro basta e logo se multiplica polo número de cadros.

Prezo: $f(x, y) = 2 \cdot 12x + 2 \cdot 10y \implies f(x) = 24x + 20 \frac{0,3}{x} = 24x + \frac{6}{x}$

Para saber o prezo mínimo, calculamos o mínimo da función:

$$f'(x) = 24 - \frac{6}{x^2}$$

$$\text{Extremos } f'(x) = 0 \implies 24 - \frac{6}{x^2} = 0 \implies 24 = \frac{6}{x^2} \implies 24x^2 = 6 \implies x^2 = \frac{6}{24} = \frac{1}{4} \implies x = \pm \frac{1}{2}$$

No contexto a solución $x = -\frac{1}{2}$ non ten sentido, polo tanto a descartamos. Vemos se $x = \frac{1}{2}$ é mínimo.

$$\frac{f'(x) < 0}{\text{decrece}} \quad \frac{f'(x) > 0}{\text{crece}} \implies \text{logo } x = \frac{1}{2} \text{ é un mínimo}$$

$$y = \frac{0,3}{x} \xrightarrow{x=0,5} y = \frac{0,3}{0,5} = 0,6$$

logo para que se pague o mínimo o lado que vale 12 €/m ten que ser de $0,5 \text{ m}$, e o outro de $0,6 \text{ m}$.

b) Un cadro vale $24 \cdot 0,5 + 20 \cdot 0,6 = 12 + 12 = 24 \text{ €}$

Temos 274 cadros, logo $274 \cdot 24 = 6576 \text{ €}$

3. a) Enuncia o teorema de Rolle. (Galicia múltiples anos)

b) Considera a función $f(x) = \frac{1}{x^4}$.

I. Comproba que $f(2) = f(-2)$.

II. Comproba que non existe $c \in [-2, 2]$ tal que $f'(c) = 0$.

III. Hai unha contradición coa conclusión do teorema de Rolle?

(Balears Ordinaria 2021)

a) **TEOREMA DE ROLLE.** Sexa $f(x)$ unha función continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) e tal que $f(a) = f(b)$. Entón existe $c \in (a, b) / f'(c) = 0$.

b) I. $f(2) = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$
 $f(-2) = \frac{1}{(-2)^4} = \frac{1}{16}$ Efectivamente, $f(2) = f(-2)$

II. $f'(x) = -\frac{4}{x^5}$ $f'(x) = 0 \Rightarrow -\frac{4}{x^5} = 0 \Rightarrow -4 = 0$ Non pasa nunca, logo non existe $c / f'(c) = 0$.

III. Non contradice o teorema de Rolle porque para poder aplicar este teorema a función ten que ser continua no intervalo. Esta función non é continua en $[-2, 2]$ xa que $0 \in [-2, 2]$ non pertence ao dominio.



Nome: _____

1 1 pto	2 1 pto	3 1 pto	Nota

(Se non hai indicacións, todos os apartados valen o mesmo)

1. Calcula as seguintes integrais:

a) $\int (x^2 - 3)(4x + 1) dx$

b) $\int \frac{e^x + e^{-x}}{2} dx$

2. Calcula as seguintes integrais:

a) $\int \sin(2x + 3) \cos(x - 1) dx$

b) $\int \frac{x + 3}{x^2 + 6x + 5} dx$

3. Calcula as seguintes integrais:

a) $\int \frac{-5 \cos x}{\sqrt{1 + \sin x}} dx$

b) $\int \frac{(\sqrt{x} - b)^2}{\sqrt{x}} dx$

1. Calcule as seguintes integrais:

a) $\int (x^2 - 3)(4x + 1) dx$

b) $\int \frac{e^x + e^{-x}}{2} dx$

a) $\int (x^2 - 3)(4x + 1) dx = \int (4x^3 + x^2 - 12x - 3) dx = x^4 + \frac{x^3}{3} - 6x^2 - 3x + C$

b) $\int \frac{e^x + e^{-x}}{2} dx = \int \frac{e^x}{2} dx + \int \frac{e^{-x}}{2} dx = \frac{1}{2} \int e^x dx - \frac{1}{2} \int e^{-x} dx = \frac{1}{2} e^x - \frac{1}{2} e^{-x} + C = \frac{e^x - e^{-x}}{2} + C$

2. Calcule as seguintes integrais:

a) $\int \sin(2x + 3) \cos(x - 1) dx$

b) $\int \frac{x + 3}{x^2 + 6x + 5} dx$

a) $\int \sin(2x + 3) \cos(x - 1) dx = \int \frac{\sin(3x + 2) + \sin(x + 4)}{2} dx =$

$= \frac{1}{2} \int \sin(3x + 2) dx + \frac{1}{2} \int \sin(x + 4) dx = -\frac{1}{6} \cos(3x + 2) - \frac{1}{2} \cos(x + 4) + C$

b) $\int \frac{x + 3}{x^2 + 6x + 5} dx \quad \begin{cases} t = x^2 + 6x + 5 \\ dt = (2x + 6) dx \Rightarrow dt = 2(x + 3) dx \\ \frac{dt}{2} = (x + 3) dx \end{cases}$

$\int \frac{dt/2}{t} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} \ln|t| + C = \frac{1}{2} \ln|x^2 + 6x + 5| + C$

3. Calcule as seguintes integrais:

a) $\int \frac{-5 \cos x}{\sqrt{1 + \sin x}} dx$

b) $\int \frac{(\sqrt{x} - b)^2}{\sqrt{x}} dx$

a) $t = 1 + \sin x \Rightarrow dt = \cos x dx$

$\int \frac{-5}{\sqrt{t}} dt = -5 \frac{t^{-1/2+1}}{-1/2+1} + C = -5 \frac{\sqrt{t}}{1/2} + C =$

$= -10 \sqrt{1 + \sin x} + C$

b) $t = \sqrt{x} - b \Rightarrow dt = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \Rightarrow 2 dt = \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

$\int t^2 \cdot 2 \cdot dt = 2 \frac{t^3}{3} + C = \frac{2}{3} (\sqrt{x} + b)^3 + C$