

Prevenção



049027 1,59 €
Coripitol
50 ml
Ácido graxo hiperconcentrado 50 ml

009860 0,97 €
Coripitol
20 ml
Ácido graxo hiperconcentrado 20 ml

Indicados en lesións por presión, LPP (prevención e tratamento na categoría I)
Aplicar 2-3 veces ao día, estendendo suavemente, sen dar masaxe nin presionar
Melloran a hidratación e evitan a sequidade da pel aumentando a súa resistencia ao rozamento
Facilitan a renovación celular epidérmica
Mantéñen o nivel de oxixenación dos tecidos de apoio, aumentando a microcirculación

AGHO



034373 1,15 €
Conveen Protect
50 g
Crema barreira de protección

034558 4,51 €
3M Cavilon
28 ml
Película barreira de protección en vaporizador

Indicado na protección da pel fronte a fluídos corporais e a humidade en casos de incontinencia urinaria e fecal leve
Aplicar unha capa fina e deixar absorber. Retirar con produto graxo
Pode permanecer ata un día se se dan as condicións adecuadas e na pel perilesional ata o cambio de apósito

Indicado para protexer a pel íntegra ou danada por irritantes (exsudado ou fluídos corporais), adhesivos e a fricción
Aplicar cada 24-72 horas, sen necesidade de retirar o produto aplicado anteriormente
Favorece a adhesividade dos apósitos, protexendo a pel
Non contén alcol, substancias irritantes nin citotóxicas
Non aplicar sobre áreas de pel con infección nin como única protección da infección en zonas de inserción de catéters ou lesións de espesor parcial ou total

Produtos barreira



715482 13,58 €
Microdacyn60 Hidrogel
120 g
Xel para limpeza de feridas

715495 9,30 €
Granudacyn Solución
500 ml
Solución para limpeza de feridas

Ten 90 días de estabilidade tras a súa apertura


Indicado para lesións con sospeita de biofilm ou a presenza de bacterias resistentes
Non é citotóxico nin irritante. Pódese aplicar sobre todo tipo de tecidos (nariz, oído e garganta) e fistulas

Non estéril
Ten 60 días de estabilidade tras a súa apertura

Limpeza

Limpeza

TIPO DE TECIDO
NO LEITO DA FERIDA



SECUNDARIOS



716406 1,45 €
Hydrotac Transparent
10 x 10 cm
Apósito de hidroxel

Achega humidade ao leito da ferida. Non usar en feridas exsudativas
Favorece o desbridamento autolítico, a granulación e a epitelización
Precisa suxección
É transparente

Hidroxel



025666 0,48 €
Varihesive Gel-Control
10 x 10 cm
Apósito hidrocoloidal de alta absorción

009947 1,18 €
Varihesive Gel-Control
15 x 15 cm
Apósito hidrocoloidal de alta absorción

716515 1,42 €
Comfeel Plus Sacro
17 x 17 cm
Apósito hidrocoloidal de sacro

Favorece o desbridamento e a cicatrización
Absorción e retención do exsudado
Non aplicar directamente en contacto con estruturas óseas, músculo ou tendóns, nin en feridas infectadas por tuberculoses, sífilis ou micose
Aplicar sobresaído dos bordos da lesión, de maneira que cubra 1-3 cm de pel íntegra

Hidrocoloides



025664 0,36 €
Comfeel Plus Transparente
10 x 10 cm
Apósito hidrocoloidal de protección fina

025665 0,79 €
Varihesive Extra Fino
15 x 15 cm
Apósito hidrocoloidal de protección fina

Protección da pel en áreas de rozamento ou fricción
Favorece o desbridamento e a cicatrización
Non aplicar directamente en contacto con estruturas óseas, músculo ou tendóns, nin en feridas infectadas por tuberculoses, sífilis ou micose
Aplicar sobresaído dos bordos da lesión, de maneira que cubra 1-3 cm de pel íntegra

Hidrocoloides finos



716514 1,97 €
Mepilex Border Flex Lite
10 x 10 cm
Apósito escuma poliuretano estratificado de baixa adherencia con bordo

Absorción e retención de exsudado
Aplicar asegurando que a área de absorción cobre completamente a ferida
Non se adhíre á ferida favorecendo a retirada atraumática, previndo os danos na pel perilesional e no leito da ferida

Siliconas finas



027503 1,63 €
Biatain Silicone Non-border
10 x 10 cm
Apósito escuma poliuretano de baixa adherencia

027505 3,43 €
Biatain Silicone Non-border
15 x 15 cm
Apósito escuma poliuretano de baixa adherencia

Absorción e retención do exsudado
Aplicar asegurando que a área de absorción cobre completamente a ferida
Non se adhíre á ferida favorecendo a retirada atraumática, previndo os danos na pel perilesional e no leito da ferida

Siliconas sen bordo



089482 0,77 €
Alleevyn Gentle Border
7,5 x 7,5 cm
Apósito escuma poliuretano de baixa adherencia con bordo

055242 1,09 €
Biatain Silicone Border
12,5 x 12,5 cm
Apósito escuma poliuretano de baixa adherencia con bordo

716471 2,51 €
Biatain Silicone Border
17,5 x 17,5 cm
Apósito escuma poliuretano de baixa adherencia con bordo


716465 3,30 €
Mepilex Border Flex Oval
13 x 16 cm
Apósito adhesivo escuma multifórmula

716466 2,42 €
Mepilex Border Sacrum
15 x 15 cm
Apósito adhesivo escuma sacro

716469 2,46 €
Aquacel Foam Pro
19,8 x 14 cm
Apósito adhesivo escuma poliuretano de talón

Absorción e retención do exsudado
Aplicar asegurando que a área de absorción cobre completamente a ferida
Non se adhíre á ferida favorecendo a retirada atraumática, previndo os danos na pel perilesional e no leito da ferida

Siliconas con bordo



025659 0,89 €
Biatain Non Adhesive
10 x 10 cm
Apósito hidropoliimérico/hidrocoloidal s/adhesivo

025661 1,79 €
Biatain Non Adhesive
15 x 15 cm
Apósito hidropoliimérico/hidrocoloidal s/adhesivo

025663 2,64 €
Alleevyn Heel
10,5 x 13,5 cm
Apósito hidropoliimérico/hidrocoloidal de talón

Absorción e retención do exsudado
Aplicar asegurando que a área de absorción cobre completamente a ferida

Escumas sen adhesivo



017901 0,58 €
Alleevyn adhesive
7,5 x 7,5 cm
Apósito hidropoliimérico/hidrocoloidal c/adhesivo

017902 1,10 €
Alleevyn adhesive
12,5 x 12,5 cm
Apósito hidropoliimérico/hidrocoloidal c/adhesivo

022321 2,09 €
Alleevyn adhesive
17,5 x 17,5 cm
Apósito hidropoliimérico/hidrocoloidal c/adhesivo

028849 3,19 €
Alleevyn Sacrum
22 x 22 cm
Apósito adhesivo escuma poliuretano sacro

Absorción e retención do exsudado
Aplicar asegurando que a área de absorción cobre completamente a ferida

Escumas con adhesivo



089486 1,31 €
Aquacel Ag Foam
10 x 10 cm
Apósito escuma poliuretano de baixa adherencia con prata

089487 3,40 €
Aquacel Ag Foam
17,5 x 17,5 cm
Apósito escuma poliuretano de baixa adherencia con prata

Indicado para reducir a carga bacteriana en feridas exsudativas, diminuindo a dor e o mal cheiro
Debe colocarse en contacto directo coa ferida
Reavaliar a súa necesidade despois de 15 días de uso
Retirar se se precisa realizar unha RNM ou radioterapia
Debido á súa composición multilapla simplifícan o uso de combinacións
Aplicar asegurando que a área de absorción cobre completamente a ferida
Non empregar conxuntamente con antisépticos nin produtos enzimáticos (colaxenasa).



068676 2,11 €
Aquacel Foam
12,5 x 12,5 cm
Apósito multilapla adhesivo

089518 3,16 €
Aquacel Foam
17,5 x 17,5 cm
Apósito multilapla adhesivo

089520 2,63 €
Aquacel Foam no adhesivo
15 x 15 cm
Apósito multilapla no adhesivo

Boa absorción e retención do exsudado, mesmo baixo presión
Debido á súa composición multilapla simplifícan o uso de combinacións
Aplicar asegurando que a área de absorción cobre completamente a ferida

Multicapas



704447 2,13 €
ConvaMax Superabsorbente no adhesivo
20 x 20 cm
Apósito iodoeno superabsorbente poliálcool e silicatos

Feridas con alto nivel de exsudado
Rápida capacidade de absorción e excelente retención do exsudado
Pode utilizarse debaixo da vendaxe compresiva
Colocar coa cara azul cara ao exterior

Superabsorbente

PRIMARIOS



025655 0,88 €
Intrasite gel
15 g
Hidroxiel emase

Colocar sen que sobresaia polos bordos da ferida
En feridas cavitadas, encher ata un 50% do seu volume
Achega humidade ao leito da ferida
Non usar en feridas exsudativas nin combinar con fibras
Favorece o desbridamento autolítico

Hidroxel



017888 1,52 €
Actisorb Plus 25
6,5 x 9,5 cm
Apósito de carbón e prata

708934 1,91 €
Vliwaktiv Ag
10 x 10 cm
Apósito de carbón e prata

Indicado para reducir a carga bacteriana en feridas cheirentas
Debe colocarse en contacto directo coa ferida
Debe humedecerse, con soro fisiolóxico ou auga estéril, se hai pouco exsudado
En feridas cavitadas non encher completamente
Reavaliar a súa necesidade despois de 15 días de uso
Retirar se se precisa realizar unha RNM ou radioterapia
Non usar en embarazadas nin en nenos.
Non empregar conxuntamente con antisépticos nin produtos enzimáticos (colaxenasa)



027398 1,27 €
Askina Carbonsorb
10 x 10 cm
Apósito de carbón


Indicado en feridas cheirentas
Aplicarase a capa branca máis grossa de viscosa sobre a lesión

Carbóns



055286 1,20 €
Urgotul
10 x 12 cm
Apósito líquido coloidal flexible

Favorece a cicatrización
Reduce a dor e as adherencias
Non se recomenda en feridas infectadas



009752 1,55 €
Biatain Contact
10 x 7,5 cm
Apósito lámina silicona

Interfase protectora en lesións de distinta etiología.
Non se adhíre ao leito da ferida
Recomendable en peles fráxiles
Favorece a epitelización
Non se recomenda en feridas infectadas



061612 1,75 €
Urgotul Ag
10 x 12 cm
Apósito con prata en malla


Indicado para reducir a carga bacteriana, diminuindo a dor e o mal cheiro
Debe colocarse en contacto directo coa ferida
Adáptase ao leito da ferida, permitindo unha retirada indolora
Reavaliar a súa necesidade despois de 15 días de uso
Retirar se se precisa realizar unha RNM ou radioterapia
Non empregar conxuntamente con antisépticos nin produtos enzimáticos (colaxenasa)



082626 2,66 €
Cutimed Sorbact
7 x 9 cm
Malla de redución carga bacteriana por medios físicos pregada

Indicado para reducir a carga bacteriana en feridas colonizadas criticamente ou infectadas (mesmo fungos)
Debe colocarse en contacto directo coa ferida
En feridas secas pode combinarse con hidroxel
Non debe utilizarse con pomadas ou cremas de base graxa
Reavaliar a súa necesidade despois de 15 días de uso

Mallas



051365 5,54 €
Iodosorb Powder
3 g
Po de cadaesmo iodado


Indicado para reducir a carga bacteriana en feridas exsudativas con esfáculos e tecido desvitalizado pero nunca necrótico seco
Debe colocarse en contacto directo coa ferida
Co uso experimenta unha perda de cor e deixa residuos que deben limparse
Debe protexerse a pel perilesional e pode ocasionar dor e/ou prido tras a súa aplicación
Reavaliar a súa necesidade despois de 15 días de uso
Non usar en embarazadas nin en nenos. Tampouco en pacientes con trastornos tiroideos ou disfunción renal. E nunca preto de ollos, oídos, nariz ou boca
Non empregar conxuntamente con antisépticos nin produtos enzimáticos (colaxenasa)

C. Iodado



022928 2,53 €
Trionic
9,5 x 9,5 cm
Apósito bioactivo con carga iónica

Só debe utilizarse en feridas con atraso na cicatrización
Non utilizar en feridas infectadas
Axustar tamaño ao leito da ferida
En feridas cavitadas encher ata o 75% do volume



716516 5,06 €
Cutimed Epiona
5 x 5 cm
Apósito modulador de metaloproteasas de matriz


Só debe utilizarse en feridas con atraso na cicatrización (sospeita de exceso metaloproteasas)
Non utilizar en feridas infectadas
Pode humedecerse con solución salina ou solución de Ringer
É biodegradable



716517 7,61 €
Urgostart Plus Pad
10 x 10 cm
Apósito modulador de metaloproteasas de matriz

Só debe utilizarse en feridas con atraso na cicatrización (sospeita de exceso metaloproteasas)
Non utilizar en feridas infectadas, fistulas nin lesións tumorais
Aplicar coa capa microadherente en contacto total co leito da ferida

Bioactivos



009917 1,58 €
Aquacel Extra
10 x 10 cm
Apósito hidrocoloidal non adhesivo

Alta absorción e retención do exsudado, mesmo baixo presión
Favorece o desbridamento autolítico e a cicatrización
En feridas cavitadas encher ata un 75% do seu volume
Non humedecer o apósito previamente á súa colocación



025668 3,52 €
Aquacel Extra
15 x 15 cm
Apósito hidrocoloidal non adhesivo

Alta absorción e retención do exsudado, mesmo baixo presión
Favorece o desbridamento autolítico e a cicatrización
En feridas cavitadas encher ata un 75% do seu volume
Non humedecer o apósito previamente á súa colocación



025669 1,32 €
Aquacel Cinta
2 x 45 cm
Apósito hidrocoloidal non adhesivo en cinta

Alta absorción e retención do exsudado, mesmo baixo presión
Favorece o desbridamento autolítico e a cicatrización
En feridas cavitadas encher ata un 75% do seu volume
Non humedecer o apósito previamente á súa colocación



025653 0,70 €
Cutimed Alginate
10 x 10 cm
Apósito de alonato de calcio

Boa absorción e retención do exsudado, mesmo baixo presión
Favorece o desbridamento autolítico e a cicatrización
Ten efecto hemostático
Colocar sen sobresaír dos bordos da lesión
En feridas cavitadas encher ata un 75% do seu volume
Non humedecer o apósito previamente á súa colocación



073112 2,85 €
Urgoclean
10 x 10 cm
Apósito fibras de poliacrilato poliadsorbimento feridas

Indicado para feridas con tecido desvitalizado onde se precise desbridamento
Debe axustarse ao tamaño da ferida e coa capa microadherente en contacto directo
Non humedecer o apósito previamente á súa colocación



716530 2,74 €
Urgoclean Ag
5 x 6 cm
Apósito fibras de poliacrilato con prata poliadsorbimento feridas

Indicado para reducir a carga bacteriana en feridas con esfáculos e tecido desvitalizado
Debe axustarse ao tamaño da ferida e coa capa microadherente en contacto directo
Non humedecer o apósito previamente á súa colocación
Reavaliar a súa necesidade despois de 15 días de uso
Retirar se se precisa realizar unha RNM ou radioterapia
Non empregar conxuntamente con antisépticos nin produtos enzimáticos (colaxenasa)




033748 1,75 €
Aquacel Extra Ag+
10 x 10 cm
Apósito de prata alta absorción

Indicado para reducir a carga bacteriana en feridas exsudativas, diminuindo a dor e o mal cheiro
Debe colocarse en contacto directo coa ferida
En cavidades encher ata o 75% do seu volume
Reavaliar a súa necesidade despois de 15 días de uso
Retirar se se precisa realizar unha RNM ou radioterapia
Non empregar conxuntamente con antisépticos nin produtos enzimáticos (colaxenasa)



033749 3,95 €
Aquacel Extra Ag+
15 x 15 cm
Apósito de prata alta absorción

Indicado para reducir a carga bacteriana en feridas exsudativas, diminuindo a dor e o mal cheiro
Debe colocarse en contacto directo coa ferida
En cavidades encher ata o 75% do seu volume
Reavaliar a súa necesidade despois de 15 días de uso
Retirar se se precisa realizar unha RNM ou radioterapia
Non empregar conxuntamente con antisépticos nin produtos enzimáticos (colaxenasa)



046814 2,01 €
Aquacel Ag+ Cinta
2 x 45 cm
Apósito de prata alta absorción en cinta

Indicado para reducir a carga bacteriana en feridas exsudativas, diminuindo a dor e o mal cheiro
Debe colocarse en contacto directo coa ferida
En cavidades encher ata o 75% do seu volume
Reavaliar a súa necesidade despois de 15 días de uso
Retirar se se precisa realizar unha RNM ou radioterapia
Non empregar conxuntamente con antisépticos nin produtos enzimáticos (colaxenasa)

Fibras

