

ANALÍTICA EXEMPLO

Análisis	Resultado	Unidades	Val. Referencia
SERIE BLANCA			
LEUCOCITOS	8.63	$\times 10^3/\text{mm}^3$	[3.5 - 11]
CAYADOS %	0	%	[0 - 3]
SEGMENTADOS %	45	%	[40 - 75]
LINFOCITOS %	43	%	[19 - 48]
MONOCITOS %	7	%	[0 - 10]
EOSINOFILOS %	5	%	[0 - 10]
BASOFILOS %	0	%	[0 - 2]
SERIE ROJA			
HEMATIES	5.38	mill/mm3	[4.2 - 6.2]
HEMOGLOBINA	15.5	gr/dl	[13 - 17.5]
HEMATOCRITO	45.7	%	[40 - 54]
VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO	84.9	fL	[80 - 104]
HEMOGLOBINA CORPUSC. MEDIA	28.7	pgr	[27 - 34]
CONC. HEMOGL. CORP. MEDIA	33.9	g/dl	[29 - 35]
SERIE PLAQUETARIA			
PLAQUETAS	263	$\times 10^3/\text{mm}^3$	[150 - 400]
VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO	10.2	fL	[7.4 - 14]
Análisis	Resultado	Unidades	Val. Referencia
GLUCOSA BASAL	* 126	mg/dl	[65 - 120]
UREA	29.2	mg/dl	[17 - 55]
CREATININA	0.9	mg/dl	[0.5 - 1.3]
ACIDO URICO	6.3	mg/dl	[2.5 - 7]
COLESTEROL TOTAL	180	mg/dl	[130 - 220]
HDL - COLESTEROL	41.9	mg/dl	[35 - 75]
LDL - COLESTEROL	115.7	mg/dl	[5 - 190]
TRIGLICERIDOS	112	mg/dl	[30 - 150]
GOT (AST)	25	UI/L	[0 - 42]
GPT (ALT)	38	UI/L	[0 - 42]
GAMMA - GT	60	UI/L	[0 - 60]
FOSFATASA ALCALINA	68.0	UI/L	[35 - 120]

MARCADORES TUMORALES

Análisis	Resultado	Unidades	Val. Referencia
PSA TOTAL	2.98	ngr/ml	[0 - 4]

NOTA: Pueden hallarse valores discretamente elevados (hasta 10 ngr/ml) en enfermedades benignas de prostata. En pacientes tratados con anticuerpos monoclonales pueden obtenerse resultados falsamente elevados o disminuidos. La determinacion del PSA, debe realizarse antes de la exploracion fisica del paciente, o bien una o dos semanas despues de la misma.

PSA - LIBRE	1.19	ngr/ml	
-------------	------	--------	--

Procesos benignos: PSA libre > 20-25 % del PSA total
Procesos neoplasicos: PSA libre <20-25 % del PSA total

Notas:

- 1) En pacientes tratados con anticuerpos monoclonales, pueden hallarse resultados falsamente elevados o disminuidos.
- 2) Asimismo, la determinacion de PSA libre, debe realizarse ante de la exploracion fisica del paciente, o bien 1 a 2 semanas despues de la misma.
- 3) El indice PSA libre/PSA total, solamente es valorable para concentraciones de PSA total comprendidas entre 4 y 10 ng/mL.