

## Proporcionalidad directa

Dos **magnitudes** son **directamente proporcionales** cuando el cociente entre dos cantidades correspondientes a esas magnitudes es constante:  $\frac{a}{b} = k$ . Al número  $k$  se le llama **constante de proporcionalidad directa** o, simplemente, **constante de proporcionalidad**.

### Ejemplo 1:

En una frutería el kilo de manzanas vale 2,5 euros. Entonces las magnitudes peso (en kg) y precio (en €) son directamente proporcionales y se cumple que:

Peso (kg)	1	2	3	...	6	...
Precio (€)	2,5	5	7,5	...	15	...

Observa que al multiplicar (o dividir) un valor de una de las magnitudes, el valor correspondiente de la otra magnitud queda multiplicado (o dividido) por ese número. Además, al formar razones con los valores correspondientes de ambas magnitudes, la constante de proporcionalidad es siempre la misma:

$$\frac{1}{2,5} = \frac{2}{5} = \frac{3}{7,5} = \frac{6}{15} = 0,4$$

## Regla de tres simple directa

La **regla de tres simple directa** es un procedimiento que nos permite calcular, en magnitudes directamente proporcionales, el valor de una cantidad, conociendo otras tres cantidades relacionadas. En la práctica se forma una proporción en la que se desconoce un término al que llamaremos  $x$ . Veamos un ejemplo.

### Ejemplo 2:

Una máquina produce 800 tornillos en 5 horas. ¿Cuánto tiempo tardará en fabricar 1000 tornillos?

$$\frac{800}{1000} = \frac{5}{x} \Rightarrow x = \frac{1000 \cdot 5}{800} = 6,25$$

Por tanto, el tiempo que tardará la máquina en fabricar 1000 tornillos es 6,25 horas, des decir, 6 horas y cuarto.

Como para hallar el elemento desconocido de una proporción se multiplica en cruz y se divide por el elemento restante (una proporción está formada por dos fracciones equivalentes), a veces se escriben los elementos de las magnitudes dadas en el problema así:

$$\begin{array}{ccc} \text{Magnitud 1} & & \text{Magnitud 2} \\ a & \hline & c \\ b & \hline & d \end{array}$$

Se forma la proporción  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ , y de ésta se puede despejar cualquier elemento desconocido conocidos los otros 3.

### Ejemplo 6:

El ejemplo anterior lo podríamos plantear así:

Tornillos		Horas
800	————	5
1000	————	$x$

Por tanto, en fabricar 1000 tornillos tardará  $x = \frac{1000 \cdot 5}{800} = 6,25$  horas.

Observa que obtenemos el mismo resultado que el obtenido en el ejemplo anterior.

## Magnitudes inversamente proporcionales

Dos **magnitudes** son **inversamente proporcionales** si al multiplicar (o dividir) una de ellas por un número, la otra queda dividida (o multiplicada) por ese mismo número.

Supongamos que  $A$  y  $B$  son magnitudes inversamente proporcionales con los siguientes valores:

<b>Magnitud A</b>	$a_1$	$a_2$	$a_3$	...	$m$
<b>Magnitud B</b>	$b_1$	$b_2$	$b_3$	...	$n$

Entonces se cumple que:

$$a_1 \cdot b_1 = a_2 \cdot b_2 = a_3 \cdot b_3 = \dots = m \cdot n = k$$

Al valor de  $k$  se le llama **constante de proporcionalidad inversa**.

### Ejemplo 7:

Si un pintor tarda 48 días en pintar una casa, la relación entre el número de pintores y el tiempo que tardan en pintar una casa es inversamente proporcional, y se cumple que:

<b>Nº de pintores</b>	1	2	3	...	6	...
<b>Días</b>	48	24	16	...	8	...

En este caso, al multiplicar (o dividir) el número de pintores por un número, el número de días queda dividido (o multiplicado) por ese mismo número. Además se cumple que:

$$1 \cdot 48 = 2 \cdot 24 = 3 \cdot 16 = 8 \cdot 8 = 48$$

## Regla de tres simple inversa

La **regla de tres simple inversa** es un procedimiento para hallar una cantidad desconocida que forma proporción con otras cantidades conocidas, correspondientes a dos magnitudes inversamente proporcionales. En la práctica se forma una proporción entre una razón entre las dos magnitudes y la inversa de otra razón entre las dos mismas magnitudes, en la que se desconoce un término al que llamaremos  $x$ . Veamos un ejemplo.

### Ejemplo 8:

Un tren a una velocidad de 90 km/h tarda 2 horas en realizar un trayecto. ¿Cuánto tiempo tardará en hacer este trayecto si va a 75 km/h?

Observa que las magnitudes velocidad y tiempo son inversamente proporcionales, pues a más velocidad, menos tiempo tardará el tren en realizar el trayecto. Llamemos  $x$  al tiempo que tardará el tren en hacer el trayecto si va a 75 km/h.

Entonces:

$$\frac{90}{75} = \frac{x}{2} \Rightarrow x = \frac{90 \cdot 2}{75} = 2,4$$

Por tanto el tren tardará en hacer este trayecto 2,4 horas si va a una velocidad de 75 km/h.

También podemos resolver el problema del ejemplo anterior **reduciendo a la unidad**. Si tenemos dos magnitudes directamente proporcionales, **reducir a la unidad** es calcular la cantidad de una de las magnitudes que corresponde a una unidad de la otra magnitud.

### Ejemplo 9:

En el ejemplo anterior hallamos lo que tardaría en llegar el tren si se desplazara a 1 km/h:

$$\frac{90}{1} = \frac{x}{2} \Rightarrow x = 180 \text{ horas}$$

Si a 1 km/h tarda 180 horas, a 75 km/h tardará  $180 : 75 = 2,4$  horas

Observa que obtenemos el mismo resultado que el obtenido en el ejemplo anterior.

## Porcentajes

El **porcentaje o tanto por ciento** de una cantidad, cuyo símbolo es %, significa que de cada 100 partes de esa cantidad tomamos el tanto indicado.

Para **calcular el porcentaje o tanto por ciento de una cantidad**, multiplicamos esa cantidad por el tanto por ciento y lo dividimos entre 100. Así el  $k\%$  de una cantidad  $c$  es  $\frac{k \cdot c}{100}$ .

### Ejemplo 10:

$$\text{El } 60\% \text{ de } 2300 \text{ es } \frac{60 \cdot 2300}{100} = \frac{138000}{100} = 1380$$

Observa que en los porcentajes aparecen siempre tres cantidades relacionadas: el tanto por ciento, que llamaremos  $k$ , la cantidad total  $c$  y la parte  $a$ , de tal manera que  $k\% \text{ de } c = a \Rightarrow \frac{k \cdot c}{100} = a$ .

Para resolver problemas con porcentajes se conocen dos de las tres cantidades anteriores y hay que despejar la tercera. Para ello podemos utilizar la fórmula anterior. También podemos recurrir a hacer reglas de tres directas. Veamos un par de ejemplos.

### Ejemplo 11:

Luis compra un coche por 16000 € y le hacen un descuento de 1920 €. ¿Qué porcentaje le descuentan?

**Método 1.** Utilizando la fórmula  $k\% \text{ de } c = a \Rightarrow \frac{k \cdot c}{100} = a$ . En este caso la cantidad desconocida es  $k$ . Por tanto:

$$\frac{k \cdot 16000}{100} = 1920 \Rightarrow k = \frac{1920 \cdot 100}{16000} = 12$$

Es decir, le descuentan el 12%.

**Método 2.** Utilizando una regla de tres directa. Podemos formar la siguiente proporción:

$$\frac{16000}{100} = \frac{1920}{x} \Rightarrow x = \frac{100 \cdot 1920}{16000} = 12$$

Vemos que, en este caso, también obtenemos el mismo resultado. Un porcentaje de descuento del 12%.

### Ejemplo 12:

¿Cuál era el precio de un ordenador que está rebajado un 18% si me ha costado 900 €?

**Método 1.** Utilizando la fórmula  $k\% \text{ de } c = a \Rightarrow \frac{k \cdot c}{100} = a$ . En este caso la cantidad desconocida es  $c$ . Por tanto:

$$\frac{82 \cdot c}{100} = 900 \Rightarrow c = \frac{900 \cdot 100}{82} = 1097,56$$

Es decir, el precio del ordenador era 1097,56 €.

**Método 2.** Utilizando una regla de tres directa. Podemos formar la siguiente proporción:

$$\frac{82}{900} = \frac{100}{x} \Rightarrow x = \frac{100 \cdot 900}{82} = \frac{90000}{82} = 1097,56$$

Vemos que, en este caso, también obtenemos el mismo resultado. El precio del ordenador era 1097,56 €.

## Aumentos y disminuciones porcentuales

Aumentar una cantidad un  $k\%$  equivale a calcular el  $(100+k)\%$  de dicha cantidad.

Disminuir una cantidad un  $k\%$  equivale a calcular el  $(100-k)\%$  de dicha cantidad.

### Ejemplo 13:

El precio de la gasolina ha subido un 2 %. Si costaba 0,95 € el litro, ¿cuánto costará ahora?

Tenemos que aumentar la cantidad 0,95 en un 2 %, y esto equivale, según la teoría anterior, a calcular el 102 % de dicha cantidad, es decir:

$$\frac{0,95 \cdot 102}{100} = \frac{96,9}{100} = 0,969$$

Por tanto, el litro de gasolina cuesta ahora 0,969 €, o lo que es lo mismo, casi 97 céntimos de euro.

### Ejemplo 14:

Una cámara de vídeo cuesta 650 €, pero el vendedor me hace una rebaja del 20 %. ¿Cuánto tengo que pagar?

Ahora tenemos que disminuir la cantidad 650 en un 20 %, y esto equivale, según la teoría anterior, a calcular el 80 % de dicha cantidad, es decir:

$$\frac{650 \cdot 80}{100} = \frac{52000}{100} = 520$$

Por tanto, tendré que pagar 520 €.

### Ejemplo 15:

Unos auriculares inalámbricos cuestan 72,6 € con el 21 % de IVA incluido. ¿Cuánto costaban los auriculares antes de aplicar el tanto por ciento de impuestos?

Podemos llamar  $x$  a lo que valían los auriculares antes de aplicar el IVA. Entonces como se le ha hecho a este valor un aumento del 21 %, tenemos:

$$1,21x = 72,6 \Rightarrow x = \frac{72,6}{1,21} \Rightarrow x = 60$$

Es decir, los auriculares costaban 60 € antes de aplicarles el 21 % de IVA.