

Avaliación de riscos biolóxicos con perspectiva de xénero

Posto de traballo : Persoal auxiliar de xeriatria, persoal de mantemento, persoal de enfermería

Risco biolóxico	Diferenzas por sexo/xénero	Medidas preventivas xerais	Medidas preventivas con perspectiva de xénero
Virus respiratorios (gripe, COVID-19)	As mulleres adoitan ter máis efectos secundarios tras a vacinación. Maior risco de transmisión intrafamiliar por rol de coidados.	Campañas de vacinación. Uso de máscaras. Ventilación adecuada.	Adaptar campañas de vacinación considerando maior reactividade en mulleres. Promover medidas de conciliación para reducir a dobre exposición (traballo e fogar).
Bacterias multirresistentes (ex. MRSA, Klebsiella)	Auxiliares de xeriatria (maioría mulleres) realizan hixiene íntima e limpeza → maior contacto directo con fluídos.	Uso de luvas, batas e lentes. Protocolos de desinfección. Formación en bioseguridade.	Repartir tarefas de hixiene e limpeza entre homes e mulleres para non sobrecargar ás traballadoras. Supervisar dispoñibilidade de EPI en tallas adaptadas a ambos os sexos.
Exposición a fluídos biolóxicos (sangue, vómitos, urina)	Mulleres en coidados presentan maior risco de picadas ou salpicaduras. Risco adicional en embarazo e lactación (ex. citomegalovirus, hepatitis).	Protocolos de bioseguridade. Contedores específicos para obxectos punxentes. Vacinación hepatitis B.	Avaliar especificamente a situación de traballadoras embarazadas ou lactantes. Reatribuír tarefas cando exista risco de infección grave para a xestación.
Fungos e mofos (áreas húmidas, sistemas de ventilación)	Homes de mantemento máis expostos por roles de traballo asignados.	Mantemento preventivo de sistemas de climatización. EPI respiratorios adecuados.	Incluír formación específica tamén para mulleres, en caso de rotación de tarefas. Asegurar que máscaras se axusten á morfoloxía facial feminina.