

Avaliación de riscos químicos con perspectiva de xénero

Posto de traballo : Laboratorio farmacéutico con persoal técnico de laboratorio e persoal de limpeza.

Risco químico	Diferenzas por sexo (biolóxicas)	Diferenzas por xénero (organizativas/sociais)	Medidas preventivas propostas
Inhalación de vapores de disolventes (tolueno, cloroformo)	Risco reprodutivo en mulleres (embarazo, lactación). Alteración na calidade do esperma en homes.	Homes adoitan abrir bidóns grandes → maior exposición.	Substitución por produtos menos tóxicos, ventilación localizada, máscaras adaptadas a diferentes tallas.
Exposición dérmica durante a manipulación	Maior absorción cutánea en mulleres (pel máis fina, distinta distribución graxa).	Mujeres realizan máis pipeteo e manipulación fina.	Uso de luvas axustadas a distintas tallas, formación específica en manipulación segura.
Salpicaduras/ contacto ocular con ácidos e bases	Non diferenzas biolóxicas significativas.	Non sempre se proporcionan lentes ou pantallas adaptadas a usuarios con diferentes morfoloxías.	Gafas/pantallas axustables, revisión periódica de EPI para comodidade e eficacia.
Exposición a substancias CMR (cancerixenas, mutáxenas, reprotoxinas)	Risco directo sobre embarazo, fertilidade feminina e masculina.	Falta de información preventiva en traballadoras de limpeza (maioría mulleres).	Protocolos especiais en embarazo/lactación, substitución temporal de tarefas, formación inclusiva para todo o persoal (incluída limpeza).
Carga e traslado de recipientes químicos	Maior risco de lesións músculo-esqueléticas en mulleres se os recipientes non están adaptados á súa forza media.	Os homes son asignados con máis frecuencia a estas tarefas de carga.	Uso de carros e axudas mecánicas, repartición equitativa de tarefas sen estereotipos de xénero.