

CICLO GUÍA NO MEDIO NATURAL E TEMPO LIBRE

SOCORRISMO NO MEDIO NATURAL



Dori Seijo Souto

I.E.S. **Plurilingüe**
TERRA DE TURONIO



TEMA 7: INTOXICACIÓN E CADROS CONVULSIVOS



1. INTOXICACIÓN

INXERIR SUSTANCIA TÓXICA OU UNHA SUSTANCIA QUE EN ALTAS CANTIDADES CONVÉRTESE EN TÓXICA

SÍNTOMAS

CAUSAS



- INHALACIÓN DE GASES
- ALIMENTARIA
- PLANTAS
- PESTICIDAS
- DROGAS
- ALCOHOL
- MEDICAMENTOS



1. ALTERACIÓN DE CONSCIENCIA: DELIRIO, CONVULSIÓN, COMA
2. AS VECES CONDUCTAS AGRESIVAS, DEPRESIVAS, ALUCINACIONES (alcohol)
3. ASFIXIA E DIFICULTADE PARA RESPIRAR
4. VÓMITO OU DIARREA
5. QUEIMADURAS: BOCA, LINGUA E PEL
6. MAL ALENTO
7. PÚPILAS DILATADAS
8. DOR DE ESTÓMAGO
9. TRASTORNOS VISIÓN



INTERVENCIÓN SOCORRISTA

**AVERIGUAR TIPO DE
TÓXICO E TEMPO
TRANSCURRIDO.
RECOLLER MOSTRA DE
VÓMITO**



**REVISAR LUGAR E
ALONXAR A VÍTIMA
SI É NECESARIO**



**AFROUXAR ROUPA
EVITAR
HIPOTERMIA**



**APLICAR MOITA AUGA
SE QUEIMADURAS NA
BOCA**



**RECOLLER RECIPIENTES
PARA LEVALOS AO
HOSPITAL**



**PROVOCAR O VÓMITO
SE É SEGURO**



NON VÓMITO SI:
QUEIMADURAS BEIZOS
OLOR GASOLINA
VÍTIMA INCONSCIENTE O
CONVULSIONANDO
INXERIDO: ÁCIDO
SULFÚRICO, SOSA
CAUSTICA, NITRICO O
POTASA

**PLS
RCP (con
mascara)
TRASLADO**



Dori Seijo Souto

I.E.S. **Plurilingüe**
TERRA DE TURONIO



CADROS CONVULSIVOS

EPILEPSIA

- Sensacións premonitorias (visuais, auditivas ou olfativas)
- Pérdida brusca do coñecemento
- Convulsións tónicas (1ou 2 min): musculatura ríxida e cianosis.
- Convulsións clónicas (2 a 4 min) : sacudidas bruscas, abrir e cerrar pálpebras e incontinencia de heces.
- Despertar: amnesia temporal do episodio e somnolencia.
- Dor de cabeza e muscular.
- CADRO COMPLETO: 10/30 MIN.

ATAQUE HISTÉRICO

- A caída non é brusca e sempre diante de personas.
- Convulsións arrítmicas e descoordinadas.
- Non relaxación de esfínteres.
- Pode rematar en crisis de risa ou llanto



CONVULSIÓN S FEBRÍS

- Nenos. + 39°
- Convulsións similar a epilepsia



INTERVENCIÓN SOCORRISTA

EPILEPSIA

- CONTROLAR A CAÍDA
- POSICIÓN DECÚBITO SUPINO
- ALMOFADA OU TOALLA NA CABEZA
- AFROUSAR ROUPA
- QUITAR OBXECTOS
- NON SUXEITAR
- CONTROLAR TEMPO
- AO FINAL: PLS, LIMPAR BOCA
- TRASLADO URXENCIAS

ATAQUE HISTÉRICO

- AISLAR E TRANQUILIZAR
- ESCOITAR E APOIO PSICOLÓXICO.
- PROPOÑER ACUDIR AO MÉDICO



C. FEBRIL

- BAIXAR TEMPERATURA
- MESMA ATENCIÓN QUE NA EPILEPSIA



Dori Seijo Souto

I.E.S. Plurilingüe
TERRA DE TURONIO



