

CICLO GUÍA NO MEDIO NATURAL E TEMPO LIBRE

SOCORRISMO NO MEDIO NATURAL



Dori Seijo Souto

I.E.S. **Plurilingüe**
TERRA DE TURONIO



TEMA 8: PICADURAS E MORDEDURAS



Dori Seijo Souto

I.E.S. Plurilingüe
TERRA DE TURONIO



A EVOLUCIÓN SOE SER BOA:

5% MORTAL

A GRAVIDADE DEPENDE DE:

ANIMAL: TAMAÑO, POTENCIA, ESPECIE,


ÉPOCA DO ANO...

PERSOA: ALÉRXICA, ZONA DO CORPO,

TEMPO TRANSCURRIDO...

PEIXES

SÍNTOMAS



Mordedura víbora

1. MARCAS DE DENTES
2. DOR E INFLAMACIÓN LOCAL
3. HEMATOMA
4. DEBILIDADE, MAREO, NAUSEAS, VÓMITOS, TEMBLORES, FORMIGUEO NOS DEDOS E SONO.
5. **CASOS GRAVES: PARÁLISIS MUSCULATURA E DIFICULTADE RESPIRATORIA**

INTERVENCIÓN SOCORRISTA

1. ALONXAR DA SERPE.
2. RECOLLE INFORMACIÓN (SERPE, TEMPO...)
3. INMOVILIZAR A ZONA SEN FACER VENDAXE COMPRESIVO
4. CALMAR
5. LAVAR E DESINFECTAR A FERIDA
6. QUITAR COUAS QUE POIDAN APRETAR
7. NON SUCCIONAR NIN FACER INCISIÓNS
8. LEVAR AO HOSPITAL PARA POÑER O ANTÍDOTO: SORO ANTIOFÍDICO



PEIXES

SÍNTOMAS

1. DOR LOCAL INTENSO
2. COR VERMELLO DA ZONA
3. INFLAMACIÓN LOCAL
4. VÓMITO, FEBRE E MAREOS (pouco frecuente)



+ COMÚN: FANECA OU ESCARAPOTE



RAIA


INTERVENCIÓN SOCORRISTA

Identificar o peixe

Profunda con agullón: raia

Punzante: faneca

1. Limpar con soro salino e desinfectar
2. Aplicar calor: auga 45° durante 20/25 minutos (faneca)
3. Elevar e repousar
4. Picadura de raia: extraer agullón se non está moi incrustado



MEDUSAS



SÍNTOMAS

1. BOCHAS, URTICARIA.
2. QUEMAZÓN E INFLAMACIÓN
3. VÓMITOS
4. NAUSEAS
5. CAMBRAS
6. DIFICULTADE RESPIRATORIA
7. PÉRDIDA CONSCIENCIA E MORTE (raro)



INTERVENCIÓN SOCORRISTA

1. Quitar tentáculos se os houbera con pinzas e lubas, non tocar.
2. Desinfectar: soro fisiolóxico ou auga salgada.
3. Aplicar frío durante 15 minutos
4. acudir a urxencias se síntomas graves.



Carabela portuguesa



ABELLAS, ABELLÓNS E AVISPAS



GRAVIDADE

- Moitas picaduras: Edema, bochas, shock
- Hipersensibilidade

SÍNTOMAS

- HINCHAZÓN LOCALIZADO
- COR VERMELLO
- PICOR
- GRAVES: Dificultada para respirar, hinchazón xeralizada, perda de consciencia



INTERVENCIÓN SOCORRISTA

1. EXTRAER AGULLÓN CON PINZAS
2. APLICAR XEO
3. INYECCIÓN EPINEFRINA (ALERXIA)
4. TRASLADO URXENTE SE SÍNTOMAS GRAVES



Dori Seijo Souto

I.E.S. Plurilingüe
TERRA DE TURONIO





ARAÑAS E GARRAPATAS



ARAÑA

SÍNTOMAS

- Ardor, escozor, dor de cabeza, vómitos, sudoración, cambras, rixidez muscular

INTERVENCIÓN SOCORRISTA

1. Buscar picadura.
2. Información sobre a araña, tempo, lugar...
3. Aplicar xeo
4. Traslado

GARRAPATA

SÍNTOMAS

1 SEMANA DESPOIS:


- Dores articulares
- Rixidez pescozo
- Síntomas similares a gripe(febre, malestar...)
- Inflamación gánglios

INTERVENCIÓN SOCORRISTA

No momento: retirar con pinzas con coidado de retirala enteira e desinfectar
Con síntomas: acudir ao médico:
antibiótico e retirar garrapata



ESCORPIÓN



TIPOS EN ESPAÑA



ESCORPIÓN NEGRO
PENÍNSULA E BALEARES



ESCORPIÓN CEGO (CATALUÑA)



ZONAS ÁRIDAS PENÍNSULA



ESCORPIÓN COMÚN:
BALEARES

SÍNTOMAS

- ENTUMECEMENTO
- DOR DE LEVE A INTENSO
- SENSACIÓN DE CALOR
- DIARREA
- FORMIGUEO
- HINCHAZÓN
- BOCHAS
- AUMENTO FC
- COMA E MORTE (RARO)

INTERVENCIÓN SOCORRISTA

1. IDENTIFICAR A ESPECIE
2. DESINFECTAR
3. FRÍO LOCAL
4. REPOSO DA EXTREMIDADE
5. TRASLADO SE SÍNTOMAS GRAVES



Dori Seijo Souto

I.E.S. Plurilingüe
TERRA DE TURONIO

