

CICLO GUÍA NO MEDIO NATURAL E TEMPO LIBRE

SOCORRISMO NO MEDIO NATURAL



Dori Seijo Souto

I.E.S. *Plurilingüe*
TERRA DE TURONIO



TEMA 9: SHOCKS E OUTROS TRASTORNOS




Dori Seijo Souto

I.E.S. Plurilingüe
TERRA DE TURONIO



SHOCK ANAFILÁCTICO



CAUSAS

REACCIÓN ALÉRGICA POR MEDICAMENTOS,
COMPOSTOS QUÍMICOS, VELENO DE ANIMAIS
MOU PLANTAS, ALIMENTOS

SÍNTOMAS

PICAZÓN, NÁUSEAS, MAREO, HIPOTENSIÓN,
VÓMITOS, INFLAMACIÓN LÍNGUA OU VÍAS
RESPIRATORIAS, DIARREA, REACCIONES
CUTÁNEAS

DISMINUCIÓN DE NIVEL DE CONSCIENCIA,
DESMAIO E PARADA CARDÍACA



APLICACIÓN ADRENALINA

TRATAMIENTO

ACTUAR SEGÚN A CAUSA:
PICADURA, INTOXICACIÓN...
TUMBAR: ELEVANDO PERNAS A
NON SER QUE HAXA
DIFICULTADE RESPIRATORIA:
SEMISENTADO
INCONSCIENTE: PLS
USAR ADRENALINA
CHAMAR 061/112



SHOCK HIPOVOLÉMICO



SHOCK HIPOVOLÉMICO

CAUSAS

Pérdida grave de sangre ou outro líquido
por:

HEMORRAXIAS, PÉRDIDAS DE PLASMA
TRAUMATISMOS
VÓMITOS E DIARREAS

SÍNTOMAS:

SUDORACIÓN, TAQUICARDIA, BAIXO
RECHEO CAPILAR, PEL FRÍA E PÁLIDA,
HIPOTENSIÓN

DISMINUCIÓN DE CONSCIENCIA, DESMAIO
E PARADA CARDÍACA




TRATAMIENTO

PARAR AS HEMORRAXIAS
CHAMAR 061/111
POSICIÓN ELEVANDO
PERNAS



HIPOGLUCEMIA



< 70MG/DL

É O **DESCENSO** DA CONCENTRAÇÃO DE GLUCOSA NO SANGUE, POR DEBAIXO DOS VALORES NORMAIS

SÍNTOMAS

- SENSACIÓN DE DEBILIDADE
- FAME
- MAREO
- DOR DE CABEZA
- PEL PÁLIDA E SUDOROSA
- RESPIRACIÓN SUPERFICIAL
- CONDUTA CONFUSA OU AGRESIVA
- VISIÓN BORROSA
- DESCOORDINACIÓN DE MOVEMENTOS
- CASOS GRAVES: PÉRDIDA DE CONSCIENCIA E CONVULSIÓNS.

TRATAMIENTO

LEVE

- INXESTA 5-10 gr HC DE ABSORCIÓN RÁPIDA (XEL DE GLUCOSA, ZUMO...) CONTROL OS 15MIN



SI GLUCEMIA
< 70mg/dl

SI GLUCEMIA
>70mg/dl
TOMAR HDC ABSORCIÓN LENTA (GALLETAS, BARRITA



GRAVE

1. PARAR A BOMBA (Quitar cánula o cortar cateter)
2. GLUCAGÓN (2-8 años 1/2 vial, > 8 años 1 vial)
3. AVISAR AL 112



RECUPERA NIVEL DE CONSCIENCIA


SI

NO

SORO GLUCOSADO 10%



HIPERGLUCEMIA



>250MG/DL

É O **AUMENTO** DA CONCENTRACIÓN DE GLUCOSA NO SANGUE, POR ENRIBA DOS VALORES NORMAIS

SÍNTOMAS

- SENSACIÓN DE DEBILIDADE
- FAME
- MAREO
- DOR DE CABEZA
- PEL PÁLIDA E SUDOROSA
- RESPIRACIÓN SUPERFICIAL
- CONDUTA CONFUSA OU AGRESIVA
- VISIÓN BORROSA
- DESCOORDINACIÓN DE MOVEMENTOS
- CASOS GRAVES: PÉRDIDA DE CONSCIENCIA E CONVULSIÓNS.

TRATAMIENTO

SEN CETOSIS < 0,6

- BEBER LÍQUIDOS NO AZUCARADOS
- BOLO CORRECTO
- CONTROL DE GLUCEMIA Á HORA

CONTROL DE GLUCEMIA Á HORA



SI GLUCEMIA
DESCENDE
INFORMAR Á
FAMILIA

SI GLUCEMIA NON
DESCENDE AVISAR
FAMILIA

CON CETOSIS > 0,6

1. REPOUSO
2. NON REALIZAR EXERCICIO
3. HIDRATACIÓN CON AUGA
4. AVISAR AL 112 (Se síntomas)






CADA MINUTO CONTA



ICTUS



**INTERRUPCIÓN DO FLUXO DE
SANGUE NO CEREBRO PRIVANDO O
TECIDO CEREBRAL DE OXÍXENO**

SÍNTOMAS



1. DOR DE CABEZA MOI INTENSO

2. PÉRDIDA DE FORZA NA MITADE DO CORPO



3. DIFICULTADE PARA FALAR OU ENTENDER



4. PÉRDIDA SÚBITA DE VISIÓN



5. VERTIXE OU DESEQUILIBRIOS



INTERVENCIÓN SOCORRISTA

CHAMAR AO 061



- AFROUXAR ROUPA
- POSICIÓN SEMISENTADO
- CONTROLAR HIPOTERMIA
- NO DAR NI COMIDA NI BEBIDA
- NON DEIXAR SO
- INCONSCIENTE: PLS

